Tempranillo

Vass7R01s421-425

dintroductorductorductoral

Collection Vassal-Montpellier

1369Mtp15

John Jakes Jakes

Tempranillo 10 R7 s - 566-570







| ANNEE | 1991 | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---|--------------------------------------|--------|----------------------------|------|-------------|
| NOM Tempranillo EMPLACEMENT 10 Rg 7 1566. 570 | | | | | | | | | | | |
| Souche Nbre yeux | Débou début | rrement mi/déb | Nbre grap | Ferti- lité | Flo début | raison mi/f | fin | | raison mi/v | fin | Maturité |
| 1 | £1,3 Le 26 +8 | 26,31 | 3 | Grappe | TG disc-s | M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap | Dim 1 % - P ! -ov-ol Rg r - fo | Dim: / | Compac l-fus : inc - | cité | : L - (A) C |

Rioja ANNEE 1992 EMPLACEMENT 10 R7 1566.570 NOM Tempramello 136915 Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 16 19.3 92 Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: mi enge Vigueur: 3,5

NOM Tempranillo EMPLACEMENT 10 R70-566.570 Esp. 6.85. 1369 15 Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti-lité Floraison début mi/f | fin ouche Véraison début mi/v fin Maturité 16,3 22-3 x 30.5 2.6 257 1

> Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill :

17,8

Baie: TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

AMMET: 1994 NOM tempranillo

16,3 18.3 .

2

3

4

5

EMPLACEMENT NO R7 1566, 570

| 1369.15 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|-------------------|----------|------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----|----------|
| Souche | Wbre yeux | | rrement mi/déb | | Ferti- | Floraison debut mi/f fin | | | Véraison début mi/v fin | | | Maturité |
| 1 2 | 2 | | | 1 0 | 5 | | | | 19-7 | 22.7 | 257 | 16.8 |
| 3 & 4 & 5 | 4 | | | 3 coulul | Pour : Baie : | TC - Cdisc(sp r : B-C : S- | Mil G - M Oh-ell Gr-Rs- m - a | 1 : Co - P I -ov-ol Rg-N r - fo yrène | Dim: 18 bov-cy: Jus | l-fus : inc erb | | |

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : 10 R70. 566-570 0.1 Tempanillo

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Tempanillo 10 R73. 566-570 s. 1

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 / vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

N° d'ordre: Tempamillo
Désignation: 10 R7 0.566-570 0.1
Emplacement:

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sécéux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 155 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275,

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 169 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

N° d'ordre: Tempranillo
Désignation: 10 R70.566-570 A.5
Emplacement:

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 44 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 3.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6.

A pédoncule herbacé 7 mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions 46 x 16). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 / non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(11) A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 / irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129, A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134 A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Tempranillo 10 Rt 2-566-570 A.5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2), Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - efface (2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).